



產品名稱 沅漢益加收

證 號 肥製(微)字第0559039號

登記成分 水溶性氧化鎂3.4%
水溶性硼0.40%

性 狀 液態

使用方式與使用量

作物	使用方法	稀釋清水之倍數
花卉類	葉面噴施	1000 ~ 2000倍
果樹類		800 ~ 1500倍
蔬果類		1000 ~ 2000倍
水稻、雜糧類		800 ~ 1200倍

產品說明

成花誘導是植物生命週期中的一個重大變化。這一過程必須發生在特定的時間，以利於受精和種子的形成，從而確保繁殖的最大成功。為了滿足這些需求，植物能夠感受重要的內源和環境信號，例如植物激素水平、適時的溫度和光周期變化等。許多年生和二年生植物需要經過春化作用方能開花。這類信號從分子學角度解釋，是由名為成花素的複雜信號的傳遞引起的花的形成需要一些內源激素去誘導或是調節生理的微量元素一起達成植株營養需求，環境變動造成植株生理變化影響花期延遲或是不開。成花素會在適宜的生殖條件下形成於葉片中，並作用於芽和生長錐，誘導形成一系列的生理和形態變化。成花誘導完成後，下一步便是花原基的形成，使莖端分生組織轉變為花分生組織。簡而言之，就是使葉、芽和莖組織的細胞分化為能形成生殖器官的組織的生物化學變化過程。花芽頂端的生長點停止葉原基分化並橫向擴大，隨後形成多個螺旋狀的突起，這些突起日後能形成萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊。對於大多數植物而言，雖然成花的起始條件與環境信號密不可分，但這一過程是不可逆的。成花過程一經開始，即使再除去相應的信號，莖端依舊會繼續發育為花器官。益加收是一種從天然產物發酵的一種代謝產物成花素，透過植物的根、莖、葉傳遞到對植物的花誘導多花形成。一般使用益加收的作物會有多花形成，農民要適度疏花及疏果。

注意事項

避免陽光直射，可混合任何農藥使用。本品含硼超量施用有毒害請依肥料使用方法及使用量施用。禁止用於食品。